ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΜΕ EZICLEN®


Το EZICLEN® μπορείτε να το πάρετε με διαφορετικό τρόπο, ανάλογα αν το ραντεβού σας είναι πρωϊνό ή απογευματινό.[1,2]

ΠΡΩΙΝΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ


Η προετοιμασία πραγματοποιείται την προηγούμενη ημέρα της εξέτασης

1 


Νωρίς το βράδυ πριν από τη διαδικασία (π.χ. 6:00 μμ), ανοίξτε τη μια φιάλη EZICLEN® και μεταφέρετε το περιεχόμενο στο κύπελλο που υπάρχει στη συσκευασία

2 

Αραιώστε το φάρμακο με νερό έως ότου το επίπεδο του διαλύματος φτάσει μέχρι τη γραμμή (περίπου 0,5 λίτρα)

3 1/2 - 1hr 

Πιείτε σταδιακά το υγρό που περιέχεται στο κύπελλο σε διάστημα 30-60 λεπτών

4 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Μέσα στην επόμενη 1 ώρα, πιείτε σταδιακά 2 ακόμα κύπελλα (συνολικά 1½ λίτρο) με νερό ή διαυγές υγρό (γεμίστε μέχρι τη γραμμή)

5 

Περίπου 2 ώρες μετά την έναρξη της χορήγησης της πρώτης δόσης (π.χ. 08:00 μμ), επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 4 για τη 2η φιάλη


Η πρόσληψη του συνολικού αραιωμένου διαλύματος EZICLEN® και του επιπλέον απαιτούμενου νερού ή διαυγούς υγρού θα πρέπει να ολοκληρώνεται:

- **Σε απουσία αναισθησίας, τουλάχιστον μία ώρα πριν από την έναρξη της διαδικασίας**
- **Σε περίπτωση αναισθησίας, συνήθως τουλάχιστον 2 ώρες πριν από την έναρξη της διαδικασίας, σύμφωνα με τις οδηγίες του αναισθησιολόγου**


ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΙΕΙΤΕ **ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 3 ΛΙΤΡΑ.**

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ


Η προετοιμασία πραγματοποιείται την προηγούμενη ημέρα και την ημέρα της εξέτασης

1 


Νωρίς το βράδυ πριν από τη διαδικασία (π.χ. 6:00 μμ), ανοίξτε τη μια φιάλη EZICLEN® και μεταφέρετε το περιεχόμενο στο κύπελλο που υπάρχει στη συσκευασία

2 

Αραιώστε το φάρμακο με νερό έως ότου το επίπεδο του διαλύματος φτάσει μέχρι τη γραμμή (περίπου 0,5 λίτρα)

3 1/2 - 1hr 

Πιείτε σταδιακά το υγρό που περιέχεται στο κύπελλο σε διάστημα 30-60 λεπτών

4 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Μέσα στην επόμενη 1 ώρα, πιείτε σταδιακά 2 ακόμα κύπελλα (συνολικά 1½ λίτρο) με νερό ή διαυγές υγρό (γεμίστε μέχρι τη γραμμή)

5 

Το πρωί της διαδικασίας (10 έως 12 ώρες μετά τη βραδινή δόση), επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 4 για τη 2η φιάλη

Η πρόσληψη του συνολικού αραιωμένου διαλύματος EZICLEN® και του επιπλέον απαιτούμενου νερού ή διαυγούς υγρού θα πρέπει να ολοκληρώνεται:

- **Σε απουσία αναισθησίας, τουλάχιστον μία ώρα πριν από την έναρξη της διαδικασίας**
- **Σε περίπτωση αναισθησίας, συνήθως τουλάχιστον 2 ώρες πριν από την έναρξη της διαδικασίας, σύμφωνα με τις οδηγίες του αναισθησιολόγου**

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΙΕΙΤΕ **ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 3 ΛΙΤΡΑ.**

ΤΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ[1,2]

Την ημέρα πριν από τη διαδικασία, μπορεί να καταναλωθεί ένα ελαφρύ πρόγευμα. Στη συνέχεια, ο ασθενής θα πρέπει να προσλαμβάνει μόνο διαυγή υγρά κατά το γεύμα, το δείπνο και οποιοδήποτε άλλο γεύμα έως τη διεξαγωγή της διαδικασίας.

- **ΜΗΝ** πιείτε το περιεχόμενο των φιαλών πριν το αραιώσετε.
- **ΜΗΝ** παραλείψετε μετά από κάθε φιάλη, να πιείτε τα 2 κύπελλα νερού ή διαυγούς υγρού.

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

	 ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ	 ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ
ΖΕΣΤΑ ΡΟΦΗΜΑΤΑ	Καφές ή τσάι ΧΩΡΙΣ γάλα ή κρέμα	Καφές ή τσάι ΜΕ γάλα ή κρέμα
ΚΡΥΑ ΠΟΤΑ	Σουρωμένοι χυμοί φρούτων Ανθρακούχα αναψυκτικά Μη ανθρακούχα αναψυκτικά ...και νερό	Χυμοί φρούτων με πολτό Αλκοολούχα ποτά Υγρά κόκκινου ή μωβ χρώματος
ΦΑΓΗΤΟ	Διαυγείς μη λιπαρές σούπες	Σούπες με στερεά

- Ενημερώστε τον ιατρό σας εάν πάσχετε από κάποια ασθένεια ή παίρνετε φάρμακα.
- Εάν παίρνετε φάρμακα, θα πρέπει να τα πάρετε 1-3 ώρες πριν πάρετε το EZICLEN® ή τουλάχιστον 1 ώρα μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κάθαρσης.
- Θα πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες ακριβώς και να πιείτε όσο νερό ή διαυγή υγρά χρειάζεται ώστε να μην αφυδατωθείτε.

1. EZICLEN® Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος
2. EZICLEN® Φύλλο Οδηγιών Χρήσης Προϊόντος